



Suport Vital Bàsic amb ús d'un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA)



Comprovi la resposta

- Sacsegi amb cura
- Pregunti amb veu forta: "Es troba bé?"



Si no respon

- Obri la via aèria i comprovi la respiració

Si no respon i no respira amb normalitat

si respira amb normalitat

- Telefonar 112, envii algú a buscar un DEA

Col·loqui'l en la posició de recuperació

- Telefonar 112
- Continui valorant que la respiració segueix essent normal



Iniciï compressions toràciques immediatament

- Col·loqui les seves mans al centre del pit
- Administri 30 compressions toràciques:
 - Premi amb fermesa almenys 5 cm, però no més de 6 cm de profunditat
 - Premi a una freqüència d'almenys 100/min, però no més de 120/min
- Si està entrenat i és capaç, combini compressions toràciques amb ventilacions. Altrament, continui RCP només amb compressions
 - Col·loqui els seus llavis al voltant de la boca
 - Insufli constantment fins elevar el pit
 - Doni una nova respiració quan el pit es deprimeixi
- Continui RCP 30 compressions i 2 ventilacions



Tan aviat com arribi el DEA Posi'l en marxa i col·loqui pegats

- Segueixi les instruccions verbals/visuals
- Col·loqui un pegat sota l'aixel·la esquerra
- Col·loqui l'altre pegat sota la clavícula dreta, a prop de l'estèrnium
- Si hi ha més d'un reanimador: no interrompi la RCP



Si està indicada la descàrrega

- Allunyis i administri la descàrrega
- Continui RCP

Segueixi les instruccions del DEA

Continui RCP a menys que estigui segur que la víctima s'ha recuperat i comença a respirar amb normalitat